

AEGUNUD RAVIMID SAAB VIIA OHTLIKE JÄÄTMETE VASTUVÕTUPUNKTI VÕI APTEEKI

Apteegis võetakse elanikelt
ravimid vastu tasuta.

Ravimite äraandmiseks
sobivat kohta aitab leida

Kuhuviia

<https://www.kuhuviia.ee>



/centralbalticwaterchain

waterchain.eu



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund



Interreg
Central Baltic



Water
chain



PYHÄJÄRVI
INSTITUUTTI




TURKU AMK
TURKU UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES



TALLINN UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY



1862
RIGA TECHNICAL
UNIVERSITY



RAVIMIJÄÄGID KESKKONNAS

01

Ülemaailmse ravimite tootmise ja tarbimise kasvuga on tõusnud ravimijääkide kogused keskkonnas.

02

Ravimid jõuavad keskkonda heitveepuhastitest, haiglatest, ravimifirmade ja loomakasvatuse heitvetest.

03

Ravimijääke on leitud pinnavetest (järved, jõed, ojad), mereveest ja põhjaveest.

04

Ravimite toimeainete kõrvalmõjud: häired vee-elustiku kasvus ja paljunemises.

05

Vähe on teada järjepideva madala kontsentratsiooniga kokkupuute mõjust organismidele. Põhjuseks uuringute keerulisus ja kallidus.

RAVIMITE TOIMEAINED, MILLELE TÄHELEPANU PÖÖRATA.

METFORMIIN

Toimeainena retseptiravimites: Metfogamma, Metforal, Metformin-Ratiopharm jt.

Kasutatakse II tüüpi suhkurtõve raviks.

Põhjustab isaskalade feminiseerumist ja viljakuse vähenemist.

ETINÜÜL-ÖSTRADIOOL, LEVONORGESTREEL

Hormonaalsed ravimid, mida kasutatakse rasestumise vältimiseks.

Põhjustab isaskalade feminiseerumist; vähendab emaskalade marja hulka.

IBUPROFEEN

Toimeainena käsimüügi- või retseptiravimites: Ibuflux, Ibumax, Ibumetin, Nurofen jt.

Valuvaigistav, põletikuvastane ja palavikku alandav ravim.

Mõjutab kalade paljunemistsükli, pärsib veeorganismide kasvu ja paljunemist.

DIKLOFENAK

Toimeainena käsimüügi- või retseptiravimites: Naklofen, Voltaren, Dicloflex jt.

Põletike, valu, reumaatiliste haiguste raviks.

Raisakotkastel põhjustab neerupuudulikkust ja surma.

Põhjustab rakulisi muutusi kalade maksas, neerudes ja lõpustes.

